

Resistenzlage Ida Wolff 2014

Zeitraum: 01.01.2014 bis 31.12.2014

Anteil der resistent getesteten Erreger in Prozent (%)

	Anzahl Testungen	Penicillin	Oxacillin	Ampicillin	Ampicillin/Sulbactam	Piperacillin	Piperacillin/Tazobactam	Cefazolin	Cefuroxim	Cefotaxim	Ceftriaxon	Ceftazidim	Aztreonam	Imipenem	Meropenem	Gentamicin	Gentamicin HL	Tobramycin	Ciprofloxacin	Moxifloxacin	Tigecyclin	Co-Trimoxazol	Colistin	Vancomycin	Teicoplanin	Erythromycin	Clindamycin	Linezolid	Rifampicin	Fosfomycin	Daptomycin	Fusidinsäure
Staph. aureus *1	51	n.d.	30	n.d.	30	n.d.	30	30	30	30	30	n.d.	n.d.	30	30	0	n.d.	0	44	44	0	0	n.d.	0	0	26	21	0	1	2	1	3
Koagulase neg. Staphylokokken *1	201	n.d.	64	n.d.	64	n.d.	64	64	64	64	64	n.d.	n.d.	64	64	28	n.d.	29	51	51	1	19	n.d.	0	18	57	43	0	8	39	2	27
Enterokokken *2	396	n.d.	n.d.	18	18	18	18	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	18	n.d.	n.d.	33	n.d.	100	45	0	98	n.d.	3	0	n.d.	n.d.	0	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
E. coli	795	n.d.	n.d.	51	43	49	6	n.d.	15	10	10	5	n.d.	0	0	6	n.d.	n.d.	19	21	0	27	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Klebsiella	173	n.d.	n.d.	100	20	100	13	n.d.	12	4	4	3	n.d.	0	0	3	n.d.	n.d.	5	9	8	6	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Enterobacter	66	n.d.	n.d.	100	98	29	22	n.d.	74	27	27	24	n.d.	0	0	0	n.d.	n.d.	3	3	5	2	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Proteus	166	n.d.	n.d.	32	14	24	1	n.d.	6	2	2	1	n.d.	4	0	10	n.d.	n.d.	8	16	n.d.	26	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
P. aeruginosa	113	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	24	23	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	14	19	10	6	4	n.d.	3	8	n.d.	n.d.	n.d.	1	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.

Resistenz < 10%

Resistenz 10-49%

Resistenz >=50%

n.d. nicht getestet

*1: Ampicillin/Sulbactam, Piperacillin/Tazobactam, Cefazolin, Cefuroxim, Cefotaxim, Ceftriaxon, Imipenem, Meropenem sind von Oxacillin/Cefoxitin abgeleitet

*2: Ampicillin/Sulbactam, Piperacillin, Piperacillin/Tazobactam sind von Ampicillin abgeleitet